

Retour sur les mammites d'été

Les mammites d'été surviennent généralement de juin à septembre au pâturage. Dans l'Aveyron, la majorité des animaux atteints sont des vaches allaitantes taries ainsi que des génisses allaitantes et laitières. Des cas de mammites ont été recensés sur des génisses d'un an. Trois régions aveyronnaises ont été très touchées, l'Aubrac, le Lévézou et les Monts Lacaune.

Une enquête réalisée sur le Lévézou dans quelques exploitations atteintes de mammites au cours de l'été 2008 a permis de faire un premier bilan :

- dans 86 exploitations bovin viande touchées, en moyenne, 1 génisse et 4 vaches taries atteintes par exploitation, soit 14 % des génisses et 8 % des vaches. Le nombre d'animaux atteints peut être très important avec un maximum de 40 vaches taries touchées dans une seule exploitation !
- dans 21 exploitations bovin lait touchées, en moyenne, 2 génisses et 1 vache tarie par exploitation, soit 19 % des génisses et 5 % des vaches.

Pour les reconnaître

Les animaux atteints présentent un trayon gonflé et le quartier devient rapidement dur et douloureux. Les sécrétions lactées prennent une consistance épaisse, purulente et dégagent une odeur nauséabonde. Des abcès surgissent dans les quartiers atteints et peuvent percer à travers la peau ou vers d'autres quartiers. L'animal est fiévreux et souvent boiteux. Un ou plusieurs quartiers peuvent être infectés. Le pronostic est sombre car les lésions sont souvent importantes et le quartier est généralement perdu.

Les mouches semblent jouer un rôle dans la transmission de l'infection

Les mouches en cause sont présentes plus ou moins en permanence sur les vaches et se nourrissent de sécrétions (salive, larmes, lait, plaies). Leur trompe est terminée par des petits denticules qui leur permettent d'abraser les bords des blessures existantes et ainsi de transmettre les germes. Noter que c'est une autre espèce de mouches qui est à l'origine des kérato-conjonctivites.

Recommandations pour essayer de lutter contre ces mammites

1/ Limiter au maximum les plantes coupantes dans les pâtures car les blessures favoriseraient les mammites à mouches.

2/ Limiter les infestations par les mouches. Plusieurs méthodes sont proposées mais toutes ne disposent pas d'une autorisation. Toutes ces propositions ne fournissent pas une garantie absolue mais permettent de limiter le problème. Choisissez donc en accord avec votre vétérinaire le moyen qui vous convient :

- Essayer d'appliquer des antiparasitaires en Pour-on conjointement sur la ligne du dos et directement sur la mamelle. Sur la mamelle, le produit doit être dilué puis appliquer par friction à l'aide d'un gant ou d'une éponge sur la mamelle.
- Essayer les boucles antiparasitaires de FLECTRON® qui diffusent du produit pendant 4 mois.

- Applications régulières d'antiparasitaires en solution sur l'ensemble du corps et particulièrement au niveau de la mamelle. Les applications seront répétées au moins tous les 15 jours voire toutes les semaines en fonction du degré d'infestation.

Céline POUGET, vétérinaire conseil, FODSA-GDS12