

# LES MAMMITES D'ETE

Ces mammites surviennent le plus souvent **de juin à septembre** au pâturage. Elles touchent fréquemment les **vaches tarées et les génisses**, même si le terme de leur gestation est éloigné.

Les animaux atteints présentent un trayon gonflé et le quartier devient rapidement dur et douloureux. Les sécrétions lactées prennent une consistance épaisse, purulente et dégagent une odeur nauséabonde. Des abcès surgissent dans les quartiers atteints et peuvent percer à travers la peau ou vers d'autres quartiers. L'animal est fiévreux et souvent boiteux. La gravité clinique est variable d'une vache à l'autre. La mammite peut ne devenir apparente qu'après la mise bas suivante.

Le pronostic est sombre car les lésions sont souvent importantes et **le quartier est généralement perdu**.

Le plus souvent, la mammite est due à une bactérie appelée *Arcanobacterium pyogenes*. L'infection est véhiculée par des mouches qui se posent sur les trayons et transmettent le germe aux quartiers. Les plaies sur les quartiers ou les trayons constituent un facteur favorisant.

## Et les traitements ?

**Lorsqu'un quartier est atteint, il convient d'administrer le plus tôt possible un antibiotique.**

*Néanmoins, les bactéries s'enkystent souvent rapidement dans des abcès et deviennent très difficilement atteignables par les antibiotiques. D'autre part, la bactérie est résistante à certains antibiotiques. C'est pourquoi, même après traitement, les chances d'obtenir une guérison totale sont faibles.*

### Pourquoi traiter ?

*Traiter avec des antibiotiques va permettre de limiter l'extension de l'infection et la contamination de nouvelles mouches et donc de nouveaux animaux.*

### Avec quoi traiter ?

*Un antibiotique intramammaire et/ou un antibiotique injectable.*

## TOUT MISER SUR LA PREVENTION

### ANTIPARASITAIRES

Les mesures de contrôle des mouches pendant les périodes à risque sont prioritaires. On préférera utiliser des préparations antiparasitaires qui diffusent mieux dans les régions postérieures du corps. L'application d'antiparasitaires devra être répétée pendant toute la période à risque.

On peut essayer :

- Un antiparasitaire concentré à diluer puis à pulvériser sur la mamelle. Applications régulières une fois tous les 15 jours.
- Les boucles auriculaires insecticides d'une durée d'efficacité de 4 mois.
- Un antiparasitaire en Pour-on sur la ligne du dos ainsi que directement sur la mamelle en frictionnant bien la mamelle ; l'efficacité du Pour-on sera d'environ 4 semaines.

### TARISSEMENT

Au tarissement, il est possible de protéger les quartiers (et de traiter d'éventuelles infections inapparentes) en utilisant des seringues intramammaires sur les vaches laitières mais aussi allaitantes (action efficace pendant quelques semaines en fonction de la seringue).

**Dans tous les cas, n'hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire.**